

Document pour les patients

Mises en garde et précautions importantes

- Pendant que vous prenez Addyi, vous pourriez avoir de l'hypotension, des évanouissements et de la somnolence
- Ces effets secondaires sont plus susceptibles de se produire si :
 - Vous consommez de l'alcool
 - Vous prenez certains autres médicaments, des suppléments à base de plantes médicinales ou du jus de pamplemousse
- Vous devez attendre au moins 6 heures après avoir pris Addyi avant de conduire un véhicule ou de faire fonctionner des machines

Pourquoi utilise-t-on ADDYI?

ADDYI est utilisé dans le traitement du trouble lié à la baisse du désir sexuel chez les femmes non ménopausées qui n'ont pas eu de problèmes de baisse du désir sexuel dans le passé et qui ont une baisse du désir sexuel quel que soit le type d'activité sexuelle, la situation, ou le partenaire sexuel.

ADDYI n'améliore pas la performance sexuelle.

Que dois-je faire si j'ai des étourdissements ou de la somnolence?

- Étendez-vous immédiatement
- Consultez un médecin sans tarder ou demandez à quelqu'un d'obtenir une aide médicale immédiate si vos symptômes ne disparaissent pas ou si vous vous évanouissez (si vous perdez connaissance).
- Informez votre professionnel de la santé dès que possible en cas d'évanouissement.

Comment prendre ADDYI?

- Prenez ADDYI exactement comme vous l'a prescrit votre médecin.
- Au coucher uniquement
- Si vous oubliez de prendre une dose, sautez la dose omise et prenez votre prochaine dose au coucher le lendemain
- Limitez la quantité d'alcool que vous consommez pendant que vous prenez Addyi
- Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris suppléments naturels.

ADDYI ne doit pas être utilisé si :

- vous présentez un problème de foie;
- vous êtes enceinte ou vous allaitez;
- vous faites de l'hypotension et consommez de l'alcool